Tineidæ.

Diplodoma marginepunctella STPH. (WALLENGREN), *Scardia boleti* F. (WALLENGREN), *S. tessulatella* ZELL. (Riksmus.), *Trichophaga tapetiella* L. (WALLENGREN), *Tinea granella* L., *T. cloacella* HW., *T. misella* ZELL., *T. pellionella* L., *Tineola biselliella* HUMM.

Monopidæ.

Monopis rusticella HB.

Incurvariidæ.

Incurvaria muscalella F. (WALLENGREN), *Nemophora metaxella* HB., *Nemotois minimellus* ZELL. (WALLENGREN), *Adela cuprella* THNBG. (WALLENGREN), *A. croesella* SCOP., *A. degeerella* L.

Tischeriidæ.

Tischeria ekebladella BIERK, *T. angusticolella* DUP.

Nepticulidæ.

Nepticula anomalella GOEZE, *N. marginicolella* STT., *N. argentipedella* (BENANDER in litt.).

Hepiolidæ.

Hepiolus humuli L., *H. sylvinus* L., *H. hecta* L.

Malmö maj 1924.

Einar Wahlgren.

Coleopterologiska notiser. — De i nedanstående förteckning upptagna coleoptererna utgöra största delen av de fynd, jag under de sista tre åren gjort. De mera kritiska släktena, fr. a. småstaphylinerna, äro dock ännu obearbetade.

De trakter, jag undersökt, äro utom Göteborgstrakten, där alla vinterskördar gjorts, Ringsjöns omgivningar, Öland (mellersta delen) och Gottland (huvudsakligen sö. delen), även Gotska sandön, ehuru — tyvärr — endast på ett par dagar. Några exkursioner ha dessutom gjorts i Bohuslän och Stockholms skärgård.

Med avseende på nomenklaturen har REITTERS »Fauna Germanica» följts.

Dyschirius politus DEJ. Västerg., Partille, på den leriga stranden av Säveån.

Panagæus bipustulatus FABR. Öland, Vickleby och Greby (Räpplinge s:n). — Gottl. Visby, vid ringmuren och Fie i Lau s:n. Träffas i motsats till *P. crux major* L. alltid på torr, sandig mark.

Lamprias cyanocephala L. Öland, Greby alvar (Räpplinge s:n).

Dromius angustus BRULL. Hall. Särö, under tallbark. — Västerg. Gunnebo, på ek. Liksom alla på träd levande

Dromius-arter träffas denna huvudsakligen på vintern.

D. linearis OL. Öland, Halltorp och St. Rör. — Skåne, Klinta (vid Ringsjön). Erhålles ofta vid håvning nattetid.

Trechus discus FABR. Skåne, Klinta, nära Ringsjöns strand.

Bembidium virens GYLL. Boh. Ljungskile, på havsstranden vid Ulvesund.

B. humerale STURM, Göteborg, i Landala torvmosse.

B. gilvipes STURM. Göteborg, under bark vintertid. — Öland, Halltorp.

B. obtusum STURM. Skåne, Fågelsång, under löv.

B. Mannerheimi SAHLB. Öland, Halltorp.

Licinus depressus PAYK. Öland, St. Rör. — Gottland, Lau och Alskogs snr samt vid Fardume och Hoburgen. Uppl. Värmdön, V. Skägga. Alltid i enstaka exemplar.

Badister unipustulatus BON. Gottl., Lau s:n, i ett dike nära havet; När s:n, dels vid ån, dels under löv vid en göl i prästgårdsparken. Överallt i enstaka exemplar.

Pterostichus angustatus DUFT. 1 ex. i Änggårdsbergen vid Göteborg.

P. aterrimus HERBST. Göteborgs skärgård, Öckerö. I stor mängd vid en mosse nära havet på senhösten.

Amara prætermissa SAHLB. (*rufocincta* DEJ.). Göteborg, Landalabergen och på Öckerö i skärgården. — Boh. Ljungskile. — Gottl., Fardume.

A. infima DUFT. Cöteborg, Änggårdsbergen, i mängd i en sandgrop, huvudsakligen vintertid.

A. lucida DUFT. Öland, Halltorp, på fuktig mark.

A. ovata FABR. Gottl. »Lau backar».

Masoreus Wetterhalli GYLL. Öland, talrikt på Greby alvar (Räpplinge s:n), även vid St. Rör. — Gottl. Alskog s:n.

Platynus (Anchomenus) Krynickii SPERK. Öland, Halltorpsskogen, på skuggig och fuktig mark under mossa och löv.

Agonum (Anch.) lugens DUFT. Gottl. 1 ex. vid Närsån.

Europhilus (Anch.) scitulus DEJ. I flera exemplar på Ringsjöns strand vid Bosjökloster och Klinta.

Miscodera arctica PAYK. Göteborg, Landalabergen 1 ex. Naturen är här slående lappländsk.

Ophonus punctatulus DUFT. Öland, i mängd vid Ekerums gård.

O. puncticollis PAYK. Gottl., Lummelunds bruk och på »Lau backar» i Lau s:n.

Pseudophonus griseus PANZ. Öland, vid Halltorps gård. — Gottl., När och Lau snr, tämligen talrik.

Harpalus rubripes DUFT. Göteborg, Slottsskogen. — Öland, Greby alvar (Räpplinge s:n). — Gottl. Visby, Hoburgen, När och Lau. Överallt sparsam.

H. quadripunctatus DEJ. Västerg. Råda och i Rya skog på Hisingen. — Skåne, Snogeröd. — Gottl. Fardume.

H. fuliginosus DUFT. Göteborg, Landalabergen. — Västerg. Askim s:n, i sandtäkterna vid Hovås.

H. smaragdinus DUFT. Västerg. med föregående vid Hovås. — Uppl. Värmdön, V. Skägga. — Öland, allmän vid St. Rör. — Gottl. Hoburgen och Alskog, sparsam.

H. rufitarsis DUFT. Öland, 1 ex. på Greby alvar (Räpplinge s:n).

H. hirtipes PANZ. Öland, St. Rör, sällsynt.

H. Frölichi STURM. Öland, vid Högby prästgård, 2 ex. — Gottl. Alskog, på sandmark norr om kyrkan, 1 ex.; Vamlingbo, vid landsvägen, 1 ex.

H. neglectus DEJ. Öland, Greby (Räpplinge s:n). — Gottl. Vamlingbo.

H. anxius DUFT. Öland, Greby alvar (Räpplinge s:n).

Dichirotrichus placidus GYLL. Göteborgstrakten allmän. — Gottl. När.

Bradycellus harpalinus SERV. Skåne, Snogeröd, 1 ex. Göteborg, Landalabergen på ljungmark, flera exemplar.

Acupalpus meridianus L. Gottl. Lau.

A. flavicollis STURM. Gottl. När, 1 ex. i ett lerigt dike.

A. exiguus DEJ. Öland, Halltorp.

Balius consputus DUFT. (*Stenelophus dorsalis* GYLL.) Öland, Halltorp. — Gottl. När, under löv vid en göl i prästgårdsparken.

Haliplus variegatus STURM. Gottl. När s:n i en damm nära prästgården.

H. amœnus OLIV. Gottl., När s:n i ån.

Bidessus geminus FABR. Skåne, vid Ringsjön.
B. unistriatus ILLIG. Skåne, vid Ringsjön.
B. hamulatus GYLL. Öland, Högby, strax nedanför prästgården i Östersjön och i diken vid stranden.
Colymbetes Paykulli ER. Öland, Halltorp, i en göl vid havet.
Agabus nebulosus FORSTER. Gottl. När s:n, allmän i små, leriga gölar.
Ochtebius bicolon GERM. Gottl. När s:n, i leriga diken i själva vattenbrynet.
Limnius troglodytes GYLL. Skåne, vid Ringsjön, ofta i gräset.
L. tuberculatus MÜLL. Gottl. När s:n i ån.
Staphylinus stercorarius OL. Öland, i mängd på Greby alvar (Räpplinge s:n). — Göteborg, Landala och Änggården. — Boh. Ljungskile.
S. latebricola GRAV. Gottl. När s:n.
S. ophthalmicus SCOP. Göteborg, vid Rya skog. — Boh. Ljungskile. — Öland, Skogsby. — Gottl. Hoburgen och Sandön.
S. similis FABR. Gottl. När och Lau snr. och vid Fardume.
S. compressus MARSH. Gottl. Fardume och Sandön.
S. ater GRAV. Gottl. Hoburgen, södra branten.
Cafius xantholoma GRAV. och *C. sericeus* HOLME. Göteborgs skärgård, Öckerö, under tång på den sandiga havsstranden.
Philonthus ebeninus GRAV. Gottl. När s:n, i kospillning.
Ph. discoideus GRAV. Göteborg, St. Torp i drivhusavfall. — Stockholms skärgård, V. Skägga, samma levnadssätt.
Ph. puella NORDM. Skåne, vid Ringsjön.
Ph. fumarius GRAV. Skåne, Bosjökloster, på Ringsjöns strand.
Quedius cinctus PAYK. Skåne, Fågelsång, under löv. — Göteborg, St. Torp, i drivbänksavfall.
Q. cruentus OL. Skåne, Bosjökloster och Klinta, dels under bokbark, dels i almsaft; såväl huvudformen som *a. virens* ROTTENB., den senare talrikast.
Euryporus picipes PAYK. Skåne, vid Ringsjön, Klinta. — Stockholms skärgård, V. Skägga, september.
Xantholinus atratus HEER. Göteborg, med *Formica rufa*.
Pæderus fuscipes CURTIS. Göteborgs skärgård, Öckerö.
Lathrobium pallidum NORDM. Gottl. Fie i Lau s:n.
Lithocharis ochracea GRAV. Göteborg, St. Torp, i drivbänksavfall.
Astenus (Sunius) filiformis LATR. Göteborg, Änggården. — Öland, Greby (Räpplinge s:n). — Gottl. Hoburgen.
Stenus guttula MÜLL. Skåne, Fågelsång, vid bäcken. — Västerg. vid Lerjeån strax norr om Göteborg. Lever på steniga stränder.
S. calcaratus SCRIBA. Västerg. Lerje, vid Göta älv, i uppkastade växtämnen; ofta i mängd fr. a. vintertid.
Gymnusa brevicollis PAYK. Göteborg, Änggården (vid en torvmosse) och vid Lerje.
Atemeles emarginatus PAYK. I Göteborgstrakten ofta i mängd vårtiden med såväl *Myrmica rubra* som *Formica fusca*. — Öland, Halltorp. — Gottl. När.
Leptusa ruficollis ER. Göteborgstrakten flerestädes, fr. a. i ekskog.
Ilyobates nigricollis PAYK. Skåne, vid Ringsjön.
Ischnopoda leucopus MARSH. Västerg. Agnesberg, vid bäcken.
Atheta (Alianta) incana ER. Skåne, Fågelsång vid Lund, i bladslidor av *Typha angustifolia*.
Bledius crassicollis BOISD. Öland, Greby (Räpplinge s:n), fuktig lermark. — Gottl. Lau s:n, på fuktig sandmark nära havet.
B. arenarius PAYK. Gottl. När s:n, i ett fuktigt och sandigt dike.
Trogophloeus arcuatus STEPH. Skåne, vid Ringsjön, Klinta.
Lamprinodes saginatus GRAV. Skåne, Bosjökloster.
Tachinus rufipennis GYLL. Västerg. Lerje, vid ån, siktning under almar, mars 1922, 2 ex.
Bryoporus analis PAYK. Göteborgstrakten flerestädes.
B. cingulata MANNH. Göteborg,Änggårdsbergen, på ljungmark.

Acidota cruentata MANNH. Göteborg.

Pycnoglypta lurida GYLL. Västerg. Lerje, på sumpmark vid Göta älv.

Phyllodrepa melanocephala FABR. Ej sälls. i Göteborgstrakten, huvudsakligen under ekbark.

Ph. vilis ER. Göteborgstrakten med föregående, men sparsamt.

Reichenbachia hæmatica REICHB. Skåne, vid Ringsjön, under barken av den gamla boken vid Wrangelsborg.

Sphærites glabratus FABR. Göteborg, Slottsskogen, i gransaft.

Neuraphes angulatus MÜLL. et KUNZE. Västerg. Gunnebo, vid siktning under ekar.

Napochus Mæklini MANNH. Göteborg, med *Formica rufa*.

Rhizophagus nitidulus FABR. Skåne, vid Ringsjön, under barken av bokstubbar. — Västerg. vid Lerjeån strax norr om Göteborg, i en björkstubbe, 1 ex.

Rh. perforatus ER. Skåne, Bosjökloster, i eksaft.

Rh. cribratus GYLL. Skåne, vid Ringsjön (Klinta och Bosjökloster), i eksaft.

Rh. æneus RICHTER. Skåne, Klinta, 1 ex. i eksaft.

Nitidula carnaria SCHALLER. Göteborg, Sannegården. — Öland, Halltorp. — Gottl. Lau s:n. Träffas i benbitar på sandmark.

Cychramus 4-punctatus HERBST. Värmdön, V. Skägga, i ruttna svampar, sept. 1923.

Calytis scabra THUNB. Gotska Sandön, mellan murkna tallplankor vid norra fyrplatsen.

Dermestes atomarius ER. Boh. Ljungskile, på havsstranden. — Gottl. Lau s:n, på sandmark nära Östersjön.

Syncalypta setigera ILLIG. Denna art förekom sommaren 1923 mycket talrikt på Gottland i När och Lau snr, huvudsakligen på fuktig sandmark nära Östersjön.

Porcinolus murinus FABR. Göteborg, Änggården. — Öland, Greby (Räpplinge s:n). — Gottl. Lau s:n och Hoburgen.

Hister bimaculatus L. Göteborg, St. Torp, i drivbänksavfall.

Saprinus rufipes PAYK. Skåne, vid Ringsjön, Klinta, i en ihålig ek.

Abræus globulus CREUTZ. Gottl. När s:n, vid ån i kospillning.

Liocila marmorata FABR. Flera exemplar på Öland vid Halltorp i blommor av *Spiræa ulmaria*. Tydligen lägger även denna art sina ägg i myrstackar, i det jag vid ett tillfälle observerade, hur en hona kom flygande och slog ner i en myrstack (*Formica rufa*).

Gnorimus variabilis L. Öland, Halltorpsskogen, vanligen i murkna ekstubbar, 1 ex. i en, som var bebodd av stackmyran; någon gång i blommor av *Spiræa ulmaria*. Skåne, Bosjökloster.

Aphodius brevis ER. Öland, Greby alvar (Räpplinge s:n).

A. plagiatus L. Allmän på fuktig sandmark (aldrig i spillning) i När och Lau snr på Gottland, dock endast *a. concolor* SCHILSKY; av huvudformen sågs endast ett ex.

A. niger PANZ. Öland, Halltorp, i kospillning.

A. contaminatus HERBST. Allmän på senhösten i hästspillning på Öckerö i Göteborgs skärgård.

Heptaulacus sus HERBST. Öland, Greby alvar (Räpplinge s:n).

H. villosus GYLL. Öland, tillsammans med föreg. — Gottl. Hoburgen, vid håvning i gräset på kvällen.

Trox scaber L. Skåne, vid Ringsjön, Klinta, i en ihålig ek.

Temnochila coerulea OLIV. Gotska sandön, under barken av självdöda furor, så väl fällda som på rot stående.

Cicones variegatus HELLW. Skåne, vid Ringsjön, Klinta, på den gamla boken vid Wrangelsborg.

Lathridius Bergrothi REITT. Göteborg, i ett något vanskött, delvis mögligt herbarium.

L. constrictus GYLL. Ej sällsynt i Göteborgstrakten bland löv, torrt gräs o. d. — Sdml. Nacka s:n, vid en ihålig lind nära »Villa Plania».

Cartodere elongata CURTIS. Halland, Särö, bland löv under ekar.

Corticaria longicollis ZETT. Västerg. Gunnebo, i en ihålig ek, där troligen en myrstack funnits. Vintertid.

Emphylus glaber GYLL. Allmän i Göteborgstrakten hos *Formica rufa*. — Gottl. När s:n.

Sphærosoma pilosum PANZ. Ej sällsynt i Göteborgstrakten, fr. a. om vintern, bland mossa och löv. — Sdml. Nacka s:n, Nyckelviken.
Lycoperdina succincta L. Öland, Greby (Räpplinge s:n) och Halltorp. Är tydligen ett nattdjur, som om dagen träffas hårt fastklamrad på undersidan av stenar (Greby alvar), om natten erhålles vid håvning (Halltorp).
Tetratoma fungorum FABR. Sdml. Storängen i Nacka s:n, 5 ex. på björksvampar.
Buprestis 8-guttata L. Gotska sandön, på brädgångarna vid norra fyren.
Agrilus laticornis ILLIG. Öland, Greby (Räpplinge s:n), på ek.
Habroloma nana HERBST. Öland, Halltorp, i blommor av *Geranium sanguineum*.
Hypoganus (Corymbites) cinctus PAYK. Skåne, Kungshult. — Västerg. Råda, nära Göteborg. — Öland, Greby (Räpplinge s:n). På samtliga lokaler under ekbark.
Elater præustus FABR. Gotska sandön, under barken av en död tall på »Gumsekullen», 1 ex.
E. sanguinolentus SCHRANK. Öland, Greby (Räpplinge s:n), på ek.
E. nigroflavus GOEZE (*crocatus* LAC.) Skåne, Bosjökloster, 2 ex. på den »tusenåriga eken».
Procræus (Elater) tibialis LAC. Skåne, vid Ringsjön, Klinta, i en ihålig ek.
Dolichosoma lineare ROSSI. En typiskt ostlig art. Finnes ej på västkusten, men är allmän i Skåne vid Ringsjön, på Öland och Gottland och i Stockholms skärgård. Även funnen av SANDIN i Värmland.
Dasytes fusculus ILLIG. Skåne, Bosjökloster.
Haplocnemus nigricornis FABR. Halland, Särö. — Sdml. Nacka. — Gotska sandön. På tall, om sommaren på barren, om vintern under barken.
H. pini REDTB. Gottl., Gogs i Lau s:n.
Dictyopterus affinis PAYK. Öland, Halltorp, i en murken ekstubbe.
Cantharis violacea PAYK. Skåne, vid Ringsjön, Klinta. — Vg. Göteborg och vid Agnesberg strax norr därom, på hägg.
Absidia pilosa PAYK. Skåne, Klinta, på blommande Umbellater.
Rhagonycha lutea MÜLL. Skåne, vid Ringsjön, Råröd.
Hypebæus flavipes FABR. Skåne, Bosjökloster, 1 ex. på den »tusenåriga eken».
Tillus elongatus L. Öland, Greby (Räpplinge s:n), endast ♀♀. — Gottl. När s:n, båda könen. Träffas inomhus och är ett utpräglat dagdjur i motsats till den närstående *Opilo*.
Eledona agaricicola HERBST. Västerg. Gunnebo, på ek.
Tenebrio opacus DUFT. Skåne, Bosjökloster, i den »tusenåriga eken».
Menephilus cylindricus HERBST. Gotska sandön, under barken av självdöda furor.
Scaphidema metallicum FABR. Skåne, Bosjökloster, i en rutten bokgren.
Mycetochara axillaris PAYK. Öland, Halltorps gård, på ekved.
M. flavipes FABR. Uppl. Värmdön, V. Skägga, i en ihålig björk.
M. linearis ILLIG. Skåne, vid Ringsjön, tämligen talrik under bark av bok, ek, ask och päronträd. — Öland, Greby (Räpplinge s:n), på päronträd. Nattdjur.
Pseudocistela ceramboides L. Värmdön, V. Skägga, på bladen av sälg.
Prionychus (Eryx) ater FABR. Värmdön, V. Skägga, i en ihålig björkstubbe.
Tomoxia biguttata GYLL. Skåne, vid Ringsjön, på bokstubbar.
Mordellistena humeralis L. Öland, Halltorpsskogen, i blommor av *Spiræa ulmaria*.
Hallomenus binotatus QUENS. Skåne, vid Ringsjön, Klinta, i svampar på en bokstubbe. — Gotska sandön, i stor mängd i björksvampar.
H. axillaris ILLIG. Tillsammans med föregående art på Sandön, men sparsammare.
Caridina 3-guttata GYLL. Gotska sandön, 1 ex. under barken av en självdöd fura.
Hypulus quercinus QUENS. Skåne, vid Ringsjön, Klinta, i en ekstubbe.
Melandrya caraboides L. Skåne, Klinta, på en bokstubbe.
Sphæriestes (Salpingus) castaneus PANZ. Hall. Särö och vid Göteborg, ej

sällsynt under furubark om vintern. — Sdml. Nacka, Storängen.

Lissodema (Salp.) cursor GYLL. Skåne, vid Ringsjön, Klinta, 2 ex. i en ihålig ek.

Omophlus rufitarsis LESKE. Öland, St. Rör, på sandmark.

Anthicus setulosus BOHEM. Gottl. När s:n, Hägdarve, 1 ex. vid håvning på sandig gräsmark.

Hylophilus nigrinus GERM. Gottl. 1 ex. på en telefonstolpe vid Fardume.

H. pygmæus DEGEER. Skåne, Snogeröd, 1 ex. på en gammal ek.

Anthribus (Brachytarsus) fasciatus FORST. Gottl. När s:n, 1 ex.

Tropideres niveirostris FABR. Västerg. Råda, nära Göteborg, 1 ex. vid siktning bland grenar och löv under ekar, våren.

Rhinomacer attelaboides FABR. Gottl. Lummelunda och i När s:n, på ungtallar.

Rhynchites tomentosus GYLL. Öland, Greby (Räpplinge s:n), flera ex. på vide.

Deporaus Mannerheimi HUMMEL. (*Rhynch. megacephalus* GERM.). Skåne, vid Ringsjön, Klinta, på björk.

Apion rufirostre FABR. Öland, Halltorp. — Gottl., vid Närs kyrka. Lever på *Malva (alcea* och *moschata)*.

A. pallipes KIRBY. Göteborg, Slottsskogen, på *Mercurialis* om våren.

A. æneum FABR. Öland, Halltorp, på *Malva*.

A. radiolus KIRBY. Öland, Halltorp, på *Malva*, tillsammans med *A. rufirostre* och *A. æneum*. Gottl. När s:n, vid kyrkan.

A. onopordi KIRBY. Öland, Halltorp.

A. ononis KIRBY. Skåne, Fågelsång, på *Ononis repens*.

A. astragali PAYK. Öland, Halltorp; tämligen talrik på *Astragalus glycyphyllus*, företrädesvis på blomknopparna.

Phyllobius oblongus L. Skåne, vid Ringsjön, talrik på hagtornsblommor. — Göteborg, allmän om våren i Slottsskogen på smålönnar.

Otiorrhynchus ligneus OLIV. Västerg., Hovås i Askim s:n, 1 ex. i sandtäkterna nära havet.

Barynotus Schönherri ZETT. Västerg. Askim, 1 ex. under en stor sten nära stationen, mars 1922.

Trachyphloeus aristatus GYLL. Gottl., När s:n, i fuktiga och sandiga diken.

T. alternans GYLL. Gottl. Lau s:n, 1 ex. på stenig ler- och sandmark ej långt från havet.

T. digitalis GYLL. Öland, Greby alvar (Räpplinge s:n), flera ex.

Foucartia squamulata HERBST. Öland, Greby och Strandtorp (Räpplinge s:n), på *Melilotus*. Gottl. Lau s:n, talrikt på *Medicago falcata*.

Barypithes (Omias) mollicomus AHR. Öland, Greby (Räpplinge s:n), vid håvning nattetid i en trädgård nära alvaren, 3 ex.

Liparus coronatus GOEZE. Öland, i stor mängd på landsvägen mellan Näs och Gräsgård; under stenar vid Vickleby och Halltorp.

Lepyrus capucinus SCHALL. Göteborg, Änggårdsbergen, på sandig ljungmark. — Öland, Halltorp, på alvaren. — Gottl., Fie i Lau s:n. Att arten, såsom uppgives, skulle leva på *Salix*, förefaller högst otroligt. Jag har aldrig sett spår till någon *Salix*-art på de lokaler, där den anträffats.

Phytonomus fasciculatus HERBST. Gottl. Vamlingbo, 1 ex. på landsvägen.

Ph. adspersus FABR. Göteborg, Slottsskogen. — Skåne, vid Ringsjön. — På *Peucedanum palustre*.

Ph. plantaginis DEGEER. Göteborg, 1 ex. i Sannegårdens sandtäkter.

Gronops lunatus FABR. Gottl. När s:n, 1 ex. på fuktig sandmark.

Bagous limosus GYLL. Öland, Halltorp i en göl nära havet, 1 ex. på *Nymphæa alba*.

B. binodulus HERBST. Sdml. Nacka, 1 ex. vid siktning utmed kvarnrännan, 4. 11. 1923.

Pseudostyphlus pilumnus GYLL. Gottl. Lau, i stor mängd på *Matricaria inodora*.

Dorytomus longimanus FORST. Göteborg, mycket talrik under barken av *Populus balsamifera* på Örgryte gamla kyrkogård, vintertid. — Gottl. När s:n, juni.

Acalles echinatus GERM. Göteborg, Slottsskogen, Hisingen och vid Mölndal; siktning under ek.

Acalles roboris CURTIS. Hall. Särö, flera ex. vid siktning under ekar 25. I. 1923.

Trachodes hispidus L. Göteborg på flera lokaler. — Hall. Särö. Under ek och fr. a. lind.

Balaninus venosus GRAV. Skåne, Bosjökloster, I ex.

Litodactylus leucogaster MARSH. Västerg. Lerje, vid Göta älv bland uppkastade växtämnen om vintern. Hovås (Askim s:n), i en damm vid havet.

Phytobius canaliculatus FÅHRÆUS. Tillsammans med föregående vid Göta älv.

Craponius epilobii PAYK. Göteborg, Landalabergen, på *Epilobium angustifolium*, I ex.

Stenocarus fuliginosus MARSH. Öland, Halltorp I ex. — Gottl. När, I ex. På båda lokalerna vid håvning på torr gräsmark.

Rhytidosoma globulus HERBST. Boh. Ljungskile vid Ulvesund, på årsskott av asp.

Tapinotus sellatus FABR. Skåne, Bosjökloster, I ex. — Göteborg, Slottsskogen, ganska talrik. Lever på *Lysimachia vulgaris*.

Ceutorrhynchus angulosus BOH. Skåne, vid Ringsjön, Klinta, I ex. på *Lysimachia vulgaris*.

Rhynchænus pilosus FABR. Västerg. Råda, siktning under ek, mars. — Öland, Greby (Räpplinge s:n), på ek.

Tychius flavicollis STEPH. Västerg. Göteborg, Sannegårdens sandtäkter och Hovås sandtag (Askim s:n). — Öland, Halltorp. Lever på *Lotus corniculatus*.

T. polylineatus GERM. Öland, Strandtorp (Räpplinge s:n), på *Melilotus*, I ex.

Sibinia primita HERBST. Gottl. När s:n, på fuktig sandmark.

Anthonomus sorbi GERM. Gottl. Lau, Botvide ängar, på blommande hagtorn, omkr. 10 ex.

A. humeralis PANZ. Västerg. Lerje, vid ån, i eksaft på en stubbe, april.

Magdalis armigera GEOFFR. Öland, Greby (Räpplinge s:n), i stor mängd på ett träd av *Ulmus campestris f. suberosa*.

Magdalis barbicornis LATR. Göteborg, Slottsskogen, I ♂ på rönn, maj.

Dryophtorus corticalis PAYK. Gottl. När, I ex. under barken av en död fura.

Dryocoetes villosus FABR. Gottl. Alskog, I ex. i en ekstubbe.

Cerambyx Scopoli FÜSSL. Öland, Halltorpsskogen på blommande *Spiræa ulmaria* och hagtorn.

Nothorhina muricata SCHÖNH. Gotska sandön, i en vedstapel (tall) vid norra fyrplatsen, I ex.

Anaglyptus mysticus L. Öland, Greby (Räpplinge s:n), i blommor av *Cornus sanguinea*. — Gottl. Lau s:n, på blommande hagtorn.

Strangalia (Leptura) pubescens FABR. Gotska sandön.

Pogonochærus ovatus GOEZE. Gottl. När, i tallskog.

Stenostola ferrea SCHRANK. Skåne, vid Ringsjön, på lind. — Göteborg, Slottsskogen, på de gamla lindarna vid Bragebacken, maj.

Macroplea (Hæmonia) mutica FABR. a. *Curtisii* LAC. År 1920 vid midsommartiden förekom denna art talrikt på Öland vid Högby strax nedanför prästgården i en vik av Östersjön. Även året därpå i juli månad anträffades den på lokalen ehuru ej så talrikt (6 ex.). Den lever här på *Zostera*. Synnerligen egendomligt är fyndet av detta typiska brakvattensdjur i Ringsjön på *Potamogeton* sommaren 1922. Exemplaren härifrån överensstämma fullkomligt med de öländska.

Lochmæa cratægi FORST. Skåne, vid Ringsjön, i mängd. — Gottl. Lummelunda. Lever på hagtorn.

Galerucella nymphææ L. Göteborg, Torvmossesjön och i »Näckrosdammen». — Öland, Halltorp, i en damm nära Östersjön. Året 1921 synes ha varit särskilt gynsamt för denna art. Den förekom då i oerhörd mängd på dessa lokaler.

Hermeophaga mercurialis FABR. Skåne, vid Ringsjön, Klinta.

Derocrepis rufipes L. Öland, Halltorp, på *Astragalus glycyphyllus*.

Chrysomela limbata FABR. Öland, Halltorp, på alvaren.

Chr. sanguinolenta L. Göteborg, Lan-

dalabergen. — Hall. Fjärås. — Boh. Ljungskile. På torr, sandig gräsmark.

Chrysomela goettingensis L. Skåne, Bosjökloster.

Cryptocephalus Pini L. Gottl. Klintehamn, i mängd på småfuror.

C. flavipes FABR. Öland, Halltorp, i stor mängd på en grässluttning strax söder om gården.

C. pallifrons GYLL. Öland, Greby (Räpplinge s:n), på *Salix (aurita?)*.

C. frontalis MARSH. Öland, Greby, tills. med föregående art.

C. querceti SUFFR. Öland, Greby.

Cassida vibex L. Gottl. Lau myr.

C. ferruginea GOEZE. Gottl. När s:n, Hägdarve, på hård gräsmark.

Cassida sanguinolenta MÜLL. Boh. Ljungskile, Ulvesund, under stenar på hård gräsmark vid havet.

C. hemisphærica HERBST. Boh. Ljungskile, tillsammans med föregående art.

Rhizobius litura FABR. Gottl., Fie (Lau s:n), 1 ex. på alvarmark nära tallskog.

Platynaspis luteorubra GOEZE. Gottl. När s:n på sandmark och i Lau myr.

Hyperaspis reppensis HERBST. Gottl. Lau myr.

Scymnus bipunctatus KUGEL. Gottl. Fie (Lau s:n), på alvarmark.

Sc. rubromaculatus GOEZE. Göteborg, Slottsskogen, 1 ♀ vid siktning nära Bragebacken.

Carl H. Lindroth.

Myrmecomorphus rufescens WESTW. **funnen i Sverige.** — I TULLGREN's och WAHLGREN's stora arbete »Svenska insekter» upptages inom parentes, — då nämligen ingen art av gruppen var känd från Sverige —, gruppen *Embolemini* bland proctotrupiderna samt omnämnes den egendomliga, myrliknande *Myrmecomorphus rufescens* WESTW., såsom närmast funnen i Tyskland. Med användande av nämnda arbete kom jag vid bestämningen av en myrliknande vinglös stekel, som jag funnit i Markkärret, Almby socken i Närke, till denna art, i alla händelser till gruppen *Embolemini*, och sedan jag sänt ett ex. av djuret till amanuens W. HELLÉN i Helsingfors, vilken ägnat *Bethylinæ* uppmärksamhet i Finland, bekräftade han, att ex. tillhörde nämnda art. Djuret, som till form och färg liknar en *Myrmica*, har i Tyskland, uppgives det, anträffats bland myror. I Markkäret togs det ena ex. vid sättning av mossa, det andra då det livligt kröp uppför ett grässtrå. I Finland är *Myrmecomorphus* ej funnen, men däremot en annan art av gruppen, *Embolemus ruddii* WESTW.

Anton Jansson.

En trasslig namnfråga. — I femte delen av sina berömda Memoarer beskriver DE GEER en liten vivel, som han kläckt ur knoppar på alm, under namn av *Curculio ulmi* (p. 215 t. 6 f. 26—30). Denna art tilhör det nutida släktet *Anthonomus* och har av nästan alla författare ansetts vara samma art som *A. pedicularius* L. Endast DESBROCHERS och GRILL (Catal. Cal. p. 303) hava varit av annan mening och hänfört DE GEERS art till *A. inversus* BEDEL (= *cinctus* THOMS.). Denna tolkning grundar sig utan tvivel dels på DE GEERS förstorade avbildning (fig. 28) av ett framben, dels på det ännu i DE GEERS samling befintliga typexemplaret. Den ifrågavarande figuren kan på grund av lår-